

予防接種推奨スケジュール

次の別の種類の 予防接種までの間隔	1週間(中6日)	4週間(中27日)	1週間(中6日)	1週間(中6日)	1週間(中6日)	4週間(中27日)	4週間(中27日)	4週間(中27日)	4週間(中27日)	1週間(中6日)
	不活化 定期接種	生 任意接種	不活化 定期接種	不活化 定期接種	不活化 定期接種	生 定期接種	生 定期接種	生 任意接種	生 定期接種	不活化 定期接種
2ヶ月	B型肝炎①	ロタ①	ヒブ①	肺炎球菌①						
	↓ 4W間隔	↓ 4W間隔	↓ 4-8W間隔	↓ 27日間以上						
3か月	B型肝炎②	ロタ②	ヒブ②	肺炎球菌②	四種混合①					
			↓ 4-8W間隔	↓ 27日間以上	↓ 3-8W間隔					
4か月			ヒブ③	肺炎球菌③	四種混合②					
	↓ 20-24W間隔				↓ 3-8W間隔					
5か月	注)1回目から3回目		↓ 7か月以上	↓ 60日間以上	四種混合③	BCG				
5-8か月										
6-12か月	B型肝炎③				↓ 約6ヶ月以上					
1歳			ヒブ④	肺炎球菌④	(推奨は約1年後)	MR①	おたふく①	水痘①		
								↓ 3か月以上		
1歳3か月					四種混合④			水痘②		
3歳										日本脳炎①
										↓ 1-4W間隔
3歳(6日後)										日本脳炎②
										↓ 約1年
4歳										日本脳炎③
6歳(年長)							MR②	おたふく②		
9歳(小3-4年生)										日本脳炎Ⅱ期
										(9~13才未満)
11歳-13歳未満					二種混合					